




ໃຜສຳຮັບປາສົມນ້ຳມັນ ຢາງເລິກ ໄມ້ຟຸລ ນາຂ້າວ
ມັນສຳປະຫລັງ ອ້ອຍ ຂ້າວໂຟດ ສັບປະຣດ



- นาข้าว ช่วยให้ข้าวแตกกอดี รวงโต เมล็ดไม่ลีบ ผลผลิตต่อไร่สูง
- พืชผักสวนครัว ช่วยให้ผลดก ไม่เป็นโรค ใบไม่หยิก ยืดระยะเก็บเกี่ยวได้ยาวนานขึ้น เช่น พริก ถั่ว แตง บวบ มะเขือ
- พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ช่วยให้มีการสร้างอาหารเพิ่มขึ้น น้ำหนักดี ผลผลิตต่อไร่สูง
- ยางเล็ก แดกยอดต่อฉัตรตลอดปี กระตุ้นการแตกรากฝอย ลำต้นโตเร็ว เห็นผลภายใน 15 วัน

ใช้สำหรับยางพาราเปิดกรีด



- ใช้เพียง 1 ช้อนชา / 1 ถ้วย ขนาดบรรจุ 400 gm/ถุง



- เร่งการออกดอก ดอกโตสีสด ออกดอกตลอดปี
- แก้ปัญหาใบใบเล็ก ไม่ออกดอก เห็นผลภายใน 2 เดือน
- ไม่เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ



- เริงคอก ห่อใหญ่ สีสด ติดดอกยาวนานร่วงโรยช้า
 - เริงการแตกรากใหม่ แทนรากเก่าที่เสื่อมโทรม
 - เริงการแตกหน่อของกล้วยไม้และไม้แขวนทุกชนิด
- ง่ายต่อการขยายพันธุ์ใช้ 1 ของต้น



Cyto - อาหารเสริมทางโภชนาการ ผสมฮอร์โมนธรรมชาติ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม้ดอก, ไม้ประดับ, ไม้ผล, พืชผักสวนครัว, หน้ายาง และปลั้วน้ำมัน

- ช่วยเร่งดอก ผลดก ดอกโต สีสดติดทนนาน พืชผักสวนครัวผลผลิตสูง ป้องกันแมลง และเชื้อรา ปลดภัยต่อการบริโภค
- ใช้ทาหรือฉีดพ่นหน้ายาง ทำให้หน้ายางนุ่ม เร่งน้ำยาง กันเชื้อรา และหน้ายางตายนิ่ง
- ปลัมน้ำมัน ใช้ผสมน้ำมันคอปาล์ม หรือฉีดพ่นทางใบ เพื่อเร่งดอก เพิ่มผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปี ใช้ได้ทุกฤดูกาล ทั้งหน้าฝน, หน้าแล้ง และฤดูหนาวหาก มีขนาดบรรจุ 220 ml.และ 1000 ml. ใช้ฉีดใบ ลำต้น และใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดทางดินได้ทุกชนิด



พิมพ์ที่ สิทธิประเสริฐ พรันตัง โทร. 077-264828-30

ชอร์โคโนธรรมชาติ

เทคโนโลยีชีวภาพ

เสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี

ไฮโดร



ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ช่วยให้ดินดีขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ 5 ตอ เพิ่มคุณภาพผลผลิต



คืนความสมบูรณ์

กลับสู่พื้นแผ่นดิน

ทะเบียนนายอินทรีย์เลขที่ 87/2553 (กรมวิชาการเกษตร)

กลุ่มพัฒนาบู้ยชีวภาพ

31/1 หมู่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

www.cytoac.co.th

ติดต่อ อนันต์ 089-9803982

อัมพกา 086-4714371

ปุ๋ยไซโตไดโนมีส่วนประกอบหลัก 8 อย่าง อาทิเช่น

ฮอร์โมนไซโตไคนิน เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้กับพืชทุกชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณ การใช้ปุ๋ย แก้ปัญหาหน้าตายหนึ่ง ปาล์มลูกสืบ นอกจากนี้ยังทำให้ปาล์มผลดก ลูกโต ติดลูกตลอดปี ไม่ขาดคอ

- ช่วยกระตุ้นให้เกิดหน่อและตาใหม่ที่แข็งแรง เช่นยางเล็กจะแตกยอดต่อฉัตรตลอดปี ลำต้นอ้วนโต เห็นผลหลังจากใช้ปุ๋ยภายใน 15 วัน
- ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงลดปัญหาการพรางใบ เพิ่มการดูดซึม และสร้างสารอาหารได้ดีขึ้น ทำให้น้ำยางข้น น้ำหนักดี เปอร์เซนต์น้ำยางเพิ่ม 40-44% ปาล์มทะเลายใหญ่ผลโต น้ำหนัก ต่อทะเลายสูง
- ยืดเวลาการติดดอก ทำให้มีโอกาสได้รับการผสมเกสรมากขึ้น ไม่ผล จึงผลดก ลูกโต น้ำหนักดี
- ป้องกันโรคใบหงิก รากเน่า ต้นเน่า เก็บเกี่ยวได้ยาวนานขึ้นเช่น พริก มะเขือ ถั่ว แตง บวบ ฯลฯ
- ช่วยชะลอการแก่ของใบ ทำให้ยางผลัดใบช้าลง เพิ่มวันกรี๊ดได้มากขึ้น

สารคีเลต ทำหน้าที่ละลายธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และที่ตกค้างในดินจากการใช้ปุ๋ยเคมี ให้พืชนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยได้ 100%

- ปรับสภาพโครงสร้างดินที่เสียจากการใช้ปุ๋ยเคมี และปลูกพืชซ้ำๆ ให้ดีดังเดิม
- ทำหน้าที่ขนส่งปุ๋ยให้กับรากพืชได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อายุที่ละลายเร็วถูกจับส่งให้กับพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียจากการระเหิดระเหยไปในอากาศและตกค้างในดิน
- ทำหน้าที่ละลายธาตุอาหารรองและอาหารเสริมเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โบรอน ฯลฯ ที่มีอยู่ในดินและในปุ๋ยไซโต ให้พืชสามารถนำมาใช้ โดยไม่ต้องใส่ธาตุอาหารรองเพิ่มให้สิ้นเปลืองเวลาและต้นทุนการใช้ปุ๋ย

สารคีเลต เมื่อทำงานประสานร่วมกับฮอร์โมนไซโตไคนิน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการใช้ปุ๋ยอย่างแท้จริง โดยสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ถึง 50% เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 40%

จุลินทรีย์ ใช้ EM จากประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่ ตรึงธาตุอาหารหลัก คือ

- ไนโตรเจน แพร่งเคียว ทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศและปลดปล่อยในรูปไนเตรตเพื่อให้พืชนำไปใช้ในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไมโครไรซา (ที่อาศัยอยู่กับรากพืช) จะผลิตกรดออกมาละลายฟอสฟอรัส ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้น เนื่องจากฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากแต่เป็นธาตุที่ละลายน้ำได้ไม่ดีและเคลื่อนที่ในดินได้น้อยมาก พืชที่มีระบบรากไม่ดีมักได้รับธาตุอาหารนี้ไม่เพียงพอ
- บาซิลลัส ทำหน้าที่ตรึงโพแทสเซียม (K) โดยปล่อยกรดอ่อนๆ มาสลายธาตุโพแทสเซียม เพื่อให้โพแทสเซียมสามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและรากพืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ดีขึ้น

มูลค้างคาว มีมูลค้างคาวอายุนับ 100 ปี เป็นสูตรผสม 50% ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชครบทุกชนิด ทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมเช่น โบรอน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม



ปุ๋ยมูลค่างคาวคุณภาพสูง ไซโต AC

ชนิดของการใช้	สูตรปุ๋ย	วิธีการใช้	อัตราการใช้/ครั้ง	ประโยชน์
ปาล์มน้ำมัน	01 สีส้มพู	ปาล์มเล็ก (แรกปลูก-2 ปี)	0.3-2 กก./ต้น (ใส่เพิ่มตามอายุ ปาล์ม)	ใส่รอบๆ ทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ ช่วยให้โคนต้นขยายใหญ่ แดกยอดดี ยอดไม่พับ โดยใส่ปุ๋ยไซโตผสมยูเรีย (46-0-0) อัตราการผสมปุ๋ยไซโต 5 ส่วน ต่อปุ๋ยยูเรีย 1 ส่วน
		ปาล์มที่ได้รับผล (2 ปีขึ้นไป)	2-4 กก./ต้น (ใส่เพิ่มตามอายุ ปาล์ม)	ติดดอกติดลูกตลอดปี ไม่ขาดคอ ลูกดกโตน้ำหนักดี สามารถแก้ปัญหาลูกเล็ก ลูกลีบได้โดยใส่สูตรพิเศษ ติดต่อกัน 4-6 เดือน ตามคำแนะนำเพิ่มเติม
ยางพาราเล็ก	01 สีส้มพู	ใส่รอบโคนต้น แล้วพรวนดินกลบ	3 ชีด/ต้น	ช่วยแตกยอดต่อฉัตรตลอดปีแตกรากฝอยดี ลำต้นอวบโต มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยางเปิดกรี๊ด	02 สีฟ้า	ใส่บริเวณระหว่างร่องยาง ปีละ 1-2 ครั้ง	50 กก./ไร่ ต้นละ 7 ชีด	หน้ายางหนานุ่ม เปอร์เซนต์น้ำยางเพิ่มถึง 40-44 % น้ำยางข้น น้ำหนักเพิ่ม 1 กก./ไร่ เห็นผลภายใน 1 เดือน
ยางหน้าตายหนึ่ง	02 สีฟ้า	ใส่รอบรัศมีทรงพุ่ม	2 กก./ต้น	หลังใส่ยางปกติ ไร่ละ 1 กระสอบแล้ว ยางหน้าตายหนึ่ง ใส่เพิ่มต้นละ 2 กก. พักหน้ายาง 2 เดือน สามารถเปิดกรี๊ดได้ปกติ
ไม้ผล	01 สีส้มพู	ใส่รัศมีทรงพุ่ม เมตรละ 1 กก.	1-3 กก./ต้น	หว่านรอบๆ ทรงพุ่มช่วยติดดอกออกผลดก สามารถทำให้ติดผลนอกฤดูได้ถ้าใช้ติดต่อกันทุกเดือน ตามคำแนะนำ
พืชผัก, ไม้ดอก, มั่นสำปะหลัง, ไร่ถั่ว, สับปะรด	01 สีส้มพู	ใช้ได้ทุกระยะ	50 กก./ไร่	ผลดกโต มีระยะเก็บเกี่ยวได้ยาวนานขึ้นเช่น พริก มะเขือ ถั่ว แตง ข้าวโพด บวบ ฯลฯ ช่วยป้องกันโรคใบหงิก รากเน่า โคนเน่า แดกหน่อแตกยอดดีมาก โดยสามารถเพิ่มผลผลิตเป็นทวีคูณโดยใช้ร่วมกับยูเรีย (46-0-0) ในอัตราส่วนปุ๋ยไซโต 5 ส่วน ต่อยูเรีย 1 ส่วน
นาข้าว	01 สีส้มพู	นาหว่านใส่หลังหว่านข้าว 20-30 วัน และตอนอายุ 50-60 วัน	50 กก./ไร่	เร่งการเจริญเติบโต แดกยอดดีมาก ข้าวตั้งท้องรวงโตสม่ำเสมอ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ เพิ่มผลผลิตเป็นทวีคูณโดยใช้ร่วมกับยูเรีย (46-0-0) ในอัตราส่วนปุ๋ยไซโต 5 ส่วน ต่อยูเรีย 1 ส่วน
		นาดำใส่ตอนทำเทือก และตอนอายุ 50-60 วัน		
รองกันหลุม	01 สีส้มพู	รองกันหลุม	3 ชีด	เร่งราก เร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกรากฝอยโตเร็ว เนื่องจากมีฟอสฟอรัสสูงกว่าร็อกฟอสเฟตมาก